



DE BUBONE VENEREO.

THESES ANATOMICO-CHIRURGICÆ.

I.

SYPHILIS sæpius ex actu Venereo contrahitur, cum voluptate recipitur, at non sine dolore curatur. Pudendas partes ut plurimum adoriatur & vitiat, etiamsi alio in loco in quem primum irrepserit, appareat. Pars tacta contaminatur, dein virus ulterius pergens, per totum corpus spargitur, atque ita crescit, augeturque ut non humores tantum, sed carnes etiam partesque solidas penetret, quarum nimirum substantiam vorat.

A

I I.

BUBONES qui post concubitum cum impuriore lueque Venerèâ laboranti fœminâ celebratum exoriuntur, hujusce morbi rudimenta sunt & notæ. Hi tumores eas invadunt glandulas in quas deflunt vasa lymphatica quibus immediatè haustum est virus; scilicet inguinales, jugulares, axillares, prout pene, vulvâ, ore, mammis susceptum est. De his tantùm tumoribus qui inguina inficiunt, utpotè frequentioribus, paucis de Anatomîâ præmissis, differere animus est.

I I I.

IN utroque inguine occurrunt massulæ quædam molles, laxæ, spongiosæ, subrotundæ, ad vasa cruralia, fasciam latam inter & cutim collocatæ, ex congerie vasorum omnis generis constantes, propriâ membranulâ, in capsulæ formâ inclusæ, copiosissimâ telâ cellulari circumcinctæ, quarum aliæ sunt superiores & numero majores, aliæ inferiores & pauciores. Ab usu lymphaticæ, à situ inguinales dicuntur. Variis in morbis formam mutant, non rarò intumescunt, inflammantur, & in abscessus, vel quandoque scirrhus pessimos tendunt.

Vasa rubra, nervea & lymphatica glandularum inguinalium substantiam permeant. Arteriæ à femorali ortæ, sanguinem advehunt; venæ ad saphænam internam adeunt, nervuli cruralis soboles, sensum conciliant, tandemque vasa lymphatica è totâ extremitate inferiori prodeuntia, eas trajiciunt, cumque similibus genitalium junguntur.

I V.

TUMORES duri, renitentes, plùs minùsve dolentes, post

congressum cum impuriori sceminâ, vel in uno tantum, vel in utroque simul inguine orti, Bubones Venerei dicuntur.

V.

INTER se differunt Bubones, 1^o. ratione habitâ circumstantiarum; vel enim soli, sine aliis huius Venereæ symptomatibus apparent, vel aliis quibusdam accidentibus, Gonorrhœâ, ulceribus cancrofis, stipantur, &c. 2^o. ratione habitâ speciei, modò phlegmones, modò œdematis, modò tandem scirrhi indolem æmulantur.

V I.

NUNC citius, nunc tardius suboriuntur, undè in essentielles & consequentes dividuntur; essentielles paucis à contagio diebus prodeunt; consequentes contrâ ab inveteratâ lue, absque recenti causâ, turgescunt; sunt etiam qui Gonorrhœâ intempestivè cohibita, virulento humore suppresso, nascuntur symptomaticique dicuntur.

V I I.

AD perfectam Bubonum Venereorum diagnosim, non omit-
tenda signa commemorativa, si quidem morbi naturam plurimum elucidare valent, sicque certius discernitur tumor ab alio qui Bubonem quandoque primâ facie mentitur. His consideratis, visu necnon tactu tutior postea statuitur Bubonum diagnosim.

V I I I.

JAM verò dum locus magis quàm naturaliter decet, in inguine prominet, oculis dignoscitur tumoris moles, situs, figura, &c. Si insuper tumor digitis pressus, renitatur, doleat & inflammetur, tunc ipsum à lymphâ in glandulis convectâ, provenisse judicatur.

PRÆTEREA rutissima erunt Bubonis Venerei indicia, si is qui eo laborat, cum scorto rem habuerit; si Gonorrhœa intempestivè cohibita, vel ulceribus syphiliticis, aut aliis ejusdem luis accidentibus inveteratis laboraverit vel adhuc laboret; tunc certissimum hujusce fœdissimi morbi signum habebitur.

X.

ALIA etiam accedunt signa propria, pro quâcumque Bubonis Venerei specie: rubor, calor atque dolor, imò etiam pulsatio in tumore phlegmonodem indicant Bubonem. Tumor contrà frigidus & mollis, digitoque pressus, foveam retinens, ut nec pulsus nec dolores, aut exiguos saltem sibi adjunctos habeat, œdematodes dicitur. Demùm scirrhus vocatur Bubo, si nimirum tactui durus responseat, absque rubore & caloris & doloris sensu apparet.

X I.

BUBONUM prognosis ab eorum naturâ, & ab eorum specie desumitur. Bubo essentialis recentem tantum luem portendit, symptomatico mitior, qui inveteratum virus prænuntiat. Consequens demùm omnium vehementissimus, asperimus, & acerrimus, universalem huc & illuc serpentem luem, testatur.

X I I.

Bubo calidus & phlegmonodes tractabilior est, meliorisque eventus, ad suppurationem vergit: pituitosus & frigidus è contrà tardior ac difficilior, partim resolutione aut suppuratione, partim induratione terminatur. Scirrhus demùm

molestior & contumacior, curatuque difficilior, si exulceratur, tunc rupto tumore, ulcus continuatur cacoerthes, humorque exit foetidus, qui esse inter saniem & pus videri potest.

XIII.

SÆPE suppuratione, sæpè etiam resolutione, solvitur Bubo, nonnunquam tandem induratione detinetur.

XIV.

VARIIS ab auctoribus varia proponitur hujusce morbi curatio. Nonnulli statuunt alienam hîc esse resolutionem: copiosam contra studiosè promovendam esse, ac diligentissimè accelerandam suppurationem, existimant: si quidem, istâ ratione, venereum virus impeditur quin intùs remeet, infectoque sanguine luem universalem moveat: igitur & à medicamentis purgantibus, sanguinisque missionibus frequentioribus studiosè abstinendum esse, opinantur.

XV.

Suppurationis via licet tutior, cum sæpè sæpiùs tarda ac diuturna sit, maximaque afferat ægrotanti rædia, hinc recentiorum plurimi huic intendere dedignantur, sed ad devitandam eam omni opere enituntur; idcirco, ea quæ vehementiorem concitant inflammationem sedulò remove, victum tenuem, sanguinisque per venas detractiones, extrinsecùs super tumorem emplastra digerentia, adhibitis deinceps medicamentis mercurialibus, suadent: sicque Bubones Venereos, quam commo- dissimè & sine periculo curari posse affirmant.

X V I.

QUANAM tutior via sit ineunda, difficiliter judicatur: observare tantum nobis liceat, Bubones inter tumores criticos annumerari debere; quibus suppuratis, virus susceptum eò magis eliminatur, quò pus copiosius ac diutius effluxerit.

X V I I.

VALENTISSIMA ergò, cum jam adoleverint isti Bubones, ad concitandam suppurationem, ea adhibeantur medicamenta quæ sunt ex emollientibus, pinguibus, oleosis, glutinosis atque lubricis, tum etiam ex subacribus aut stimulantibus, ad instar cataplasinatis, aut emplastri.

X V I I I.

INGRAVESCENTE autem inflammatione, cuteque cum dolore rubente, emplastra supra dentur maturantia, diachylum scilicet cum gummis aut illud Vigonis cum mercurio.

X I X.

AD ultimum tandem finem cum pervenerit inflammatio, & jam æger, absque magno incommodo, amplius incedere non potest, aptissima erunt ea cataplasmata, quæ ex cepis sub cinere calido tostis, vel ex farinâ & melle, vel ex fermento, calida superinjiciuntur.

X X.

Pus ad maturitatem perductum, parvâ incisione, cautè factâ educendum est.

X X I.

QUONAM tempore, quonam modo, tumor sit aperiendus inter auctores ambigitur. Plerique tumoris maturitatem expectant : & hi quidem rationabiliter agunt. Si enim ocius inciditur Bubo, pus fere nullum educitur, pars tenuior expirat, crassior intus remanet; undè duriores, ut plurimum circumjecti tumores subnascuntur; imò ora incisi tumoris intumescunt & inflammantur, ulcus continuatur, quod ægrius & nonnisi concoquentibus medicamentis & pus moventibus sanescit. Non minus est periculi à nimia cunctatione : nam pus quod maturum est, si non evocetur, diutius subsidens, non tantum in sanem vertitur tenuem, & acrem, quæ proxima, atque sana rodit, undè fiunt fistulæ, sed etiam sanguini mixta, totum corpus inficit, luemque universalem esse testatur.

X X I I.

PURE, ut supra dictum est, educto, ulcus unguento digestivo diligenter expurgetur quantum satis est, usque ad perfectam cicatricem.

X X I I I.

ALTER Bubonem aperiendi modus ponitur in causticis, qui optimus est, si tumor sit frigidus & indolens, aut ægotans timidior scalpello nimis abhorrescat.

X X I V.

SUPPURATIO vix veneno planè exhaustiundo sufficit, nisi suppetias ars ferat. Vix enim fieri potest quin virus suscepti reliquæ supersint, quæ medicaminum antivenereorum usu deleri

debent, eâ lege ut horum tantò major copia exhibeatur ;
quantò brevior ac parciòr fuerit Bubonis suppuration.

X X V.

OBSERVANDUM porrò superest 1°. delitescente tumore, aut imminutâ suppuratione, retenta morbi semina, certo certius in luem universalem iri, igitur debitis antivenereis ægrum esse committendum ; 2°. Bubonem contumacem, virûs superstitis, luisque confirmatæ indicem, ulteriori antivenereorum usu esse oppugnandum ; 3°. idem agendum, Bubone nimis indurato, resolutionem necnon suppurationem æqualiter respuente.

HAS THESES, Deo juvante & Præside M. JOANNE ABRAHAM AUVITY, Artium & Chirurgia Magistro, necnon Nosocomii vulgò dicti des Enfants-trouvés, Chirurgus præcipuo, tueri conabitur JOANNES BONJOUR, Claromontanus, in alma Universitate parisiensi liberalium Artium Magister, thesios auctor.

*Die Sabbati 24^a mensis Decembris, anno R. S. H. 1785,
à sesqui-secunda post meridiem ad septimam.*

V I X X